



Instructions & Astuces

Traitement orthodontique avec les gouttières transparentes :

Ce n'est pas du « rocket science »

Mais presque...

Pour que ça marche, il faut connaître et respecter quelques points essentiels !

CE QU'IL FAUT SAVOIR :

1. La technologie de la conception et de fabrication assistée par ordinateur (CFAO) a permis le développement d'un traitement orthodontique sans métal, à l'aide des gouttières en résine transparente.
2. Depuis la première gouttière au but orthodontique fabriquée par Invisalign en 1997 jusqu'à présent le système Invisalign a évolué rendant possible des mouvements dentaires plus complexes et par conséquent élargissant ces indications dans le traitement des malocclusions dentaires.
3. Malgré sa simplicité au premier abord, la biomécanique gouvernant ce système est assez « challenging » à maîtriser et une connaissance approfondie en orthodontie est toujours requise.
4. Le traitement orthodontique avec des gouttières transparentes est une alternative aux bagues
5. Les fils ou les arcs sont remplacés par les gouttières et les bagues par des petites structures de forme très précise qu'on appelle taquets ou attaches. Ces taquets sont du composites, le même matériau de réparation des caries et sont de même couleur que les dents. Ils seront collés sur certaines dents, quand le mouvement nécessite un meilleur contrôle de la dent et de sa racine.
6. Ces gouttières sont fabriquées de la résine « plastiques » médicale
7. Comme les bagues, les gouttières sont portées tout le temps, à l'exception des repas. Après les repas, les dents sont bien lavées et les gouttières portées à nouveau
8. chaque set de gouttières est porté **pour une semaine**. Au bout d'une semaine, de nouvelles gouttières remplacent les anciennes. **DU FAIT QUE LES GOUTTIERES SONT AMOVIBLES, CE SYSTEME PERMET AU PATIENT D'ENTREtenir UNE EXCELLENTE HYGIENE BUCCALE TOUT AU LONG DU TRAITEMENT CONTRAIREMENT AUX BAGUES.**
9. Un traitement orthodontique peut nécessiter plusieurs sets de gouttières
10. Le projet orthodontique est planifié et simulé sur un ordinateur en utilisant un logiciel spécialisé, Il est présenté au patient sous forme d'une simulation tridimensionnelle. Le mouvement dentaire est simulé par le logiciel en se basant sur une amplitude « moyenne » de déplacement. Cela ne reflète jamais la réalité clinique et la spécificité biologique et physiologique de chaque personne. Donc la durée du traitement orthodontique n'est jamais et ne doit pas être calculée selon le nombre de gouttières généré par Invisalign, mais selon le type et la complexité de la malocclusion présente et la difficulté de sa correction. Seuls le médecin-dentiste avec une formation adéquate ou l'orthodontiste sont capables de déterminer et d'estimer cela.
11. **LA DUREE D'UN TRAITEMENT ORTHODONTIQUE A L'AIDE DES GOUTTIERES EST IDENTIQUE OU LEGEREMENT PLUS LONGUE A CELLE AVEC DES BAGUES. EN EFFET, LES GOUTTIERES SONT UNIQUEMENT DES MOYENS DE TRANSFERT DE FORCE COMME LES BAGUES ET LES ARCS. LA PHYSIOLOGIE DE DEPLACEMENT DENTAIRE EST TOUJOURS LA MEME ET LE RESPECT DE LA BIOMECANIQUE EST INDISPENSABLE**
12. Contrairement aux bagues, ce moyen de traitement orthodontique nécessite une coopération parfaite et une bonne discipline de la part du patient. Si le patient est bien discipliné avec le port de ses gouttières, son traitement orthodontique avance bien, sinon un retard du mouvement dentaire commence à apparaître et à s'accumuler, et le traitement doit être repris. Les dents reviennent rapidement à leur place initiale.
13. C'est aussi un système d'« autocontrôle », c'est-à-dire vous ne subissez pas comme c'est le cas avec les bagues, mais grâce à votre simulation vous êtes capable de suivre votre traitement et d'anticiper les mouvements dentaires et les pressions sur les dents.
14. Il est aussi un système non contraignant du fait de sa nature amovible.

COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?



1 ✓

Première consultation : examen primaire et explication

2 ✓

Dossier orthodontique : photos, scan, radiographies

3 ✓

Discussion et confirmation du plan de traitement et du devis

4

Mise en bouche des attaches (taquets), des boutons (si nécessaire) et les gouttières

5

Contrôles mensuels : contrôle de la progression, pose des attaches, polissage interdentaire (si nécessaire) et livraison des nouvelles gouttières de correction

6

Dossier de finition : commander des gouttières supplémentaires de correction ou de finition

7

Fabrication des contentions : Mise en bouche du fil de contention et livraison de la gouttière de contention

CE QU'IL FAUT FAIRE :

La partie la plus difficile et critique pour le succès de votre traitement est déjà réalisée : c'est la bonne planification du plan de traitement et l'élaboration d'une simulation qui concrétise ce plan orthodontique. Afin que votre traitement orthodontique avance comme prévu, certaines règles doivent être respectées :

1. Chaque set de gouttières est porté pour 1 semaine
2. La gouttière doit être portée tout le temps en dehors du repas au minimum 20 heures par jour.
3. En cas des événements ou des sorties sociales (surtout les Weekends), vous pouvez ne pas porter les gouttières afin de bien profiter avec vos proches.
4. Dans le cas d'empêchement de port des gouttières de plus que 6 heures merci de prolonger le port global de la durée d'empêchement (1 semaine + temps à compenser). Cette approche rend le système encore plus flexible et moins contraignant.
5. La gouttière doit être parfaitement adaptée sur les dents sinon les dents ne suivent pas le mouvement programmé dans chaque gouttière. Merci d'assurer cela en utilisant le Chewie régulièrement.
6. Les taquets ou les attaches présentes sur certaines dents ont pour but d'assurer le mouvement difficile de ces dents. Merci de vérifier la présence de ces taquets tout au long du traitement.
7. En cas de cassure des attaches ou de décollement, merci de nous notifier rapidement afin de les reposer.
8. Quand c'est planifié, le port de ces élastiques est demandé à chaque fois que vous portez les gouttières ou selon les instructions du Dr Khoury.
9. Le maintien d'une bonne hygiène buccale durant le traitement orthodontique est primordial. Une gingivite peut retarder le déplacement dentaire et augmente le risque d'une parodontite. Des examens et des détartrages dentaires réguliers sont recommandés pour la santé de vos dents et de vos gencives.

4

Mise en bouche des attaches (taquets), des boutons (si nécessaire) et les gouttières

Ce rendez-vous est de 60 à 75 minutes. Il a pour but la mise en bouche des attaches (taquets), des boutons (si nécessaire) sur certaines dents selon votre plan de traitement et la livraison de 4 sets de gouttières.

C QU'EST-CE QUE C'EST LES ATTACHES OU TAQUETS, LES BOUTONS ET LE POLISSAGE INTERDENTAIRE (MEULAGE INTERPROXIMAL) ?


Les attaches sont des structures en composites (comme les « plombages » blancs). Elles sont très peu visibles et seront collées sur certaines dents. Elles permettent aux gouttières d'être plus efficaces lors de certains mouvements dentaires.

Les boutons sont souvent en métal et peuvent être collés sur certaines de vos dents afin d'accrocher les élastiques intermaxillaires.

Le meulage interproximal, c'est-à-dire l'élimination d'une très mince couche d'émail sur les côtés d'une ou de plusieurs dents, peut être nécessaire afin de créer de l'espace pour aligner des dents chevauchées ou pour permettre une meilleure occlusion entre des dents du haut et les dents du bas.



LE PACKAGE INVISALIGN :



1. Un sac Invisalign
2. Boite de présentation :
 - a. Boitier de conservation des gouttières
 - b. Documents de mode d'emploi
 - c. Pastille de nettoyage des gouttières



Les gouttières sont livrées dans des sachets. Sur le sachet vous trouvez les informations suivantes.

Numéro de la gouttière/nombre total

Ce qu'il y a à faire lors de la MEB de cette gouttière :

- Attaches → Pose de taquets
- IPR → polissage interdentaire
- Precision cuts → découpe pour élastiques

La date à laquelle il faut porter la gouttière

1 SEMAINE

Vous recevez au premier rendez-vous les quatre premiers sachets.

Sur chaque sachet s'est inscrite la date à laquelle vous devez porter les nouvelles gouttières. Chaque set de gouttière est porté pour **1 semaine**.


Petite astuce : *Merci de toujours conserver vos anciennes gouttières dans les sachets correspondants. Elles seront très utiles en cas de retard du mouvement dentaire, ou de perte/cassure de vos gouttières actuelles.*



Les deux à trois premières semaines seront généralement les plus difficiles. Tout problème initial est temporaire et normal et s'améliorera rapidement! Un peu de patience durant cette période d'adaptation est essentielle. Il est permis de porter les gouttières ON/OFF durant la première semaine afin de faciliter la transition.

INSERTION DE VOS GOUTTIÈRES


1. Lavez vos mains avec de l'eau et du savon.
2. Vérifiez le numéro de la gouttière avant de l'insérer en bouche.



3. Assurez-vous que vous disposez de la bonne gouttière - Pour éviter toute confusion, chaque gouttière est gravée de votre numéro de boîtier unique, un «U» pour le haut et un «L» pour le bas, suivi du numéro de la gouttière.
4. Lorsque vous insérez chaque gouttière, une à la fois, positionnez la gouttière sur les dents antérieures et poussez doucement par-dessus.
5. Puis, appliquez une pression égale avec le bout de vos doigts, au-dessus des dents postérieures, jusqu'à ce que vous sentiez que la gouttière est bien insérée au fond.
6. Souvent une pression vers l'intérieur sur la partie postérieure de la gouttière permet d'insérer la gouttière plus facilement
7. Ne jamais croquer sur vos gouttières pour les mettre en place; cela les endommagerait et vous risqueriez de les déformer.
8. Utilisez les « Chewie » pendant 10 minutes chaque jour pour aider les gouttières à bien s'insérer au fond et également à stimuler la vascularisation sanguine, ce qui peut favoriser une meilleure progression de votre traitement. Mordez sur les Chewie en le déplaçant depuis les dents de devant jusqu'aux dents de derrière. Mordez et maintenez à chaque endroit pendant 10-15 secondes..



9. En règle générale, les nouvelles gouttières peuvent ne pas être bien ajustées contre vos dents au début. Mordre sur le Chewie aide à les se resserrer sur vos dents et à réduire le vide entre les dents et l'intérieure de la gouttière, ce qui permet à votre traitement de progresser plus rapidement.





Petite astuce : Lavez-vous la bouche avec de l'eau avant d'insérer ou de retirer les gouttières. Mouillez toujours la gouttière avec de l'eau avant de l'insérer en bouche.




Les gencives, les joues ou les lèvres peuvent être blessées ou irritées par les gouttières. Si votre gouttière a un bord tranchant, utilisez une lime à ongles pour le limer légèrement.

RETRAIT DE VOS GOUTTIÈRES

1. Commencer toujours à détacher la gouttière de derrière et l'intérieur puis de devant de l'extérieure en soulevant doucement la gouttière par-dessus des attaches.
2. Ne pas appliquer une force trop grande pour retirer les gouttières, surtout si plusieurs attachements sont utilisés pour le traitement. Cela risquerait de les déformer ou de faire décoller un ou plusieurs attachements.
3. Rincez les gouttières avec de l'eau froide seulement (jamais de l'eau chaude, car cela va ramollir ou faire fondre le plastique des gouttières et ainsi les déformer), enlevez l'excès d'eau et placez-les dans l'étui désigné.



Petite astuce : Dans le cas de plusieurs attaches sur les dents, essayez de déclipper la gouttière par-dessus des attaches et tirez sur la gouttière vers le haut ou vers le bas.



Q : Le traitement sera-t-il douloureux?

R : La plupart des gens éprouvent une gêne dentaire pendant quelques jours après le début de chaque nouvelle gouttière, et peu de patients des vraies douleurs dentaires. Dans les deux cas, ceci est normal. C'est un signe que les gouttières fonctionnent, déplaçant vos dents vers leur destination. Un comprimé de Dafalgan pourra soulager les douleurs en cas de besoin. Cette gêne/douleur devrait progressivement disparaître quelques jours après l'insertion de la nouvelle gouttière. Si ce n'est pas le cas, merci de nous appeler afin de faire un contrôle plus précis.

Q : Le port des gouttières Invisalign affectera-t-il mon élocution?

R : Comme tous les traitements orthodontiques, les gouttières peuvent affecter temporairement votre discours et vous pouvez avoir un léger zozotement pendant quelques jours. Cependant, à mesure que votre langue s'habitue à avoir des gouttières dans la bouche, tout trouble de la parole ou de la langue causé par vos gouttières devrait disparaître.

Vous allez constater que vos glandes salivaires sont stimulées pendant les deux premiers jours, mais reviendront à la normale dans environ 48 heures. Dans de rares cas, certains patients peuvent être allergiques à la matière plastique. Dans de tels cas, arrêtez l'utilisation et appelez le cabinet.

COMMENT ATTACHER LES ÉLASTIQUES



Découpe sur la gouttière

Bouton en plastique ou en métal collé sur la dent

QUOI ET POURQUOI?

Les élastiques intermaxillaires sont des rondelles en caoutchouc qui s'attache entre les dents inférieures et supérieures. Le but de ces élastiques est biomécanique, c.-à-d. neutraliser les effets secondaires d'une force en renforçant l'ancrage dentaire. Ceci va favoriser le mouvement dentaire recherché et réduire ou neutraliser le mouvement dentaire indésirable.

Elles sont prévues pour certains plans de traitement et parfois sont limitées pour une période du traitement.



COMMENT ?

1. À l'aide du crochet fourni dans le sachet, accrocher un élastique là-dessus.
2. Commencer par accrocher l'élastique sur le bouton inférieur en le poussant contre le bouton avec le doigt.
3. Ensuite tirer sur l'élastique vers le haut et devant
4. Accrocher l'élastique sur le découpe de la gouttière du haut vers le bas et vers derrière
5. Décrocher le crochet.

Petites astuces : Il est conseillé de plier la découpe vers l'extérieure avant d'insérer les nouvelles gouttières. Ceci facilite l'accrochement de l'élastique. Les premières fois, mettez les élastiques devant le miroir. Avec la pratique, vous réussissez à les mettre à l'aveugle et sans même le crochet. Patience et persévérance !

AVANCÉE MANDIBULAIRE

Dans le cas d'une retrognathie mandibulaire, il existe une option clinique d'intégrer dans les gouttières d'alignements des ailes dont la fonction mimique celle d'un Monobloc Activateur, c.-à-d. avancer la mâchoire inférieure.



Lors de la fermeture de la bouche, les ailes de la gouttière inférieure s'engagent avec celles de la supérieure induisant l'avancée de la mâchoire inférieure. Ce positionnement antérieur de cette dernière à longue durée stimule la croissance de cette mâchoire.

À savoir : cette option clinique est uniquement utile chez les patients en croissance (10 à 14ans).

ENTRETIEN ET MAINTENANCE QUOTIDIENS DE VOS GOUTTIÈRES

- Retirez toujours vos gouttières pour manger et boire. (Vous n'avez pas besoin de retirer vos gouttières pour boire de l'eau fraîche.)
- Rangez-les dans le boîtier fourni quand elles ne sont pas dans votre bouche. Ne mettez pas vos gouttières dans ou sur une serviette ou un mouchoir. De nombreuses gouttières ont été accidentellement jetées de cette façon!
- Si vous avez des animaux domestiques, ne mettez pas vos gouttières là où vos animaux peuvent les atteindre. Les animaux de compagnie sont attirés par la salive et aimeraient mâcher vos gouttières!
- Brossez-vous les dents et passez le fil dentaire après chaque repas ou collation avant de réinsérer vos gouttières. Si vous n'avez pas accès à votre système de nettoyage ou à une brosse à dents, vous pouvez simplement vous rincer bien la bouche. Ce n'est pas la meilleure façon de nettoyer, mais cela fonctionne à la rigueur.
- Nettoyez vos gouttières avant chaque insertion en les tenant sous l'eau froide courante.



NE JAMAIS FUMER AVEC VOS GOUTTIÈRES. CELA AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DU CANCER DE LA BOUCHE.


Le café, le thé, le vin ou toute autre boisson acide, sucrée ou colorée peut tacher les gouttières, les abîmer ou augmenter vos risques de caries ou des érosions dentaires.

MAINTENANCE QUOTIDIENNE

Utilisez une brosse à dents à poils doux avec de l'eau et une petite quantité de savon à mains antibactérien ou de savon à vaisselle.

Assurez-vous de bien rincer chaque gouttière avec de l'eau après chaque nettoyage.

De plus, si vous souhaitez que vos gouttières restent claires et brillantes, nous vous recommandons de les tremper dans un produit de nettoyage pour prothèses, ou de vinaigre, une fois par semaine ou au besoin. **NE PAS** utiliser de dentifrice et **NE PAS** les tremper dans un rince-bouche. Ces produits peuvent endommager la surface de l'aligneur, le rendant terne et plus visible.



5

Contrôles mensuels : contrôle de la progression, pose des attaches, polissage interdentaire (si nécessaire) et livraison des nouvelles gouttières de correction

Ces rendez-vous sont destinés à contrôler la progression du mouvement dentaire et du plan de traitement global. Lors de certaines de ces consultations, des attaches seront soit posées ou déposées selon le plan du traitement ou du polissage inter dentaire selon la nécessité.

La durée de ces rendez-vous varie entre 15 et 30 minutes. Ils prendront lieu chaque 4 à 6 semaines.

Merci de porter vos gouttières à votre rendez-vous de contrôle et d'apporter vos anciennes gouttières (au moins 2 précédentes)



Si une attache ou un bouton (transparent ou métallique) se détache, il est important de contacter notre bureau dès que possible afin de prévoir le temps pour le recoller lors de votre prochain rendez-vous ou d'agender un rendez-vous en urgence si nécessaire. Veuillez continuer à porter vos gouttières tant qu'elles sont ajustées.

Q : Que dois-je faire si ma nouvelle gouttière ne s'adapte pas sur mes dents?

R : Des écarts mineurs entre la nouvelle gouttière et la position actuelle de la dent sont normaux, car les dents ont besoin de temps pour se conformer à la nouvelle position de la nouvelle gouttière. Utiliser les Chewie d'une manière régulière afin d'améliorer l'adaptation de la gouttière sur les dents. En cas de problèmes importants avec l'alignement, merci de nous informer.



Bonne adaptation



Mauvaise adaptation

Toujours vérifier la bonne adaptation de vos gouttières sur vos dents. En cas des espaces (apparition des bulles d'air entre la gouttière et les dents), merci d'utiliser les Chewie plusieurs fois la journée ou prolonger les jours de port (1 semaine + X temps) et repousser de X la date de changement au nouveau set de gouttière.



Ne jamais changer à la nouvelle gouttière si la gouttière actuelle n'est pas parfaitement adaptée à vos dents. La durée d'une semaine est une moyenne pour que le mouvement dentaire programmé dans la gouttière s'exprime. Certains mouvements dentaires nécessitent plus de temps. Merci de prolonger la

durée de port de la gouttière sinon le retard s'accumule d'une gouttière à l'autre et risque de retarder le traitement global.



En cas de changement de dates des gouttières, il est important de nous informer avant votre prochain rendez-vous afin de prévoir les modifications nécessaires. Il est possible parfois de reporter le rendez-vous de contrôle afin de finir les gouttières que vous avez en possession.

6

Dossier de correction ou de finition : commander des gouttières supplémentaires de correction ou de finition

Le dossier de correction consiste à re scanner les dents et construire le dossier photographique (sans les radiographies) afin de réévaluer et corriger le progrès du traitement. Souvent cela coïncide avec la fin des gouttières de la première commande. Parfois, le traitement ne se développe pas comme c'était prévu et le mouvement dentaire prend du retard. Des gouttières de correction en cours de route sont à nouveau commandées.

La durée de ce rendez-vous est de 30 à 45 minutes.

Le délai d'attente pour les nouvelles gouttières est de 4 semaines (commande-fabrication-réception). Nous vous fournissons deux sets de gouttières que vous portez 2 semaines chacun. *Il est important que vous portiez ces gouttières d'une manière disciplinée afin de ne pas perdre le progrès obtenu et compromettre le plan de traitement. Merci de vous référer à la section « entretien quotidien des gouttières » !*

Q : Quelle est la différence entre les gouttières de correction et celle de finition ?

R : Les gouttières sont les mêmes, mais le but est différent. Une fois que les objectifs de traitement sont atteints, il est temps de passer à la finition. Elle consiste en de petites modifications ou améliorations, souvent de nature esthétique et personnelle, mais elles peuvent en être pour des ajustements de la morsure.

Le nombre des gouttières différent aussi. Quelques gouttières de finition sont commandées allant de 10 à 15 gouttières au maximum.

Le rendez-vous pour le dossier de finition et celui de correction est le même en durée (photos et scan des dents)



7

Fabrication des contentions : Mise en bouche du fil de contention et livraison de la gouttière de contention

Une fois les objectifs de votre traitement sont atteints (les vôtres et les nôtres), il est essentiel de stabiliser les dents à leurs nouvelles positions. Une contention est obligatoire.

Une partie non négligeable des traitements orthodontiques est dédiée au traitement de reprise due aux récurrences. Les dents ont tendance à revenir à leurs positions initiales, car elles étaient forcées dans leurs nouvelles positions. La contention a pour but de sauvegarder cette nouvelle position et d'empêcher la récurrence.

Il existe deux types de contention. Chacun a ses points positifs et négatifs. Elle doit être portée à vie, quel que soit son type :

Contention amovible: même style que la gouttière de correction ou finition, mais celle de la contention est plus épaisse. Elle aide à garder une bonne hygiène buccale. Elle doit être portée que la nuit, mais chaque nuit et uniquement pour la mâchoire supérieure.



Contention fixe: un fil rigide ou semi-rigide collé derrière les six dents inférieures de devant. C'est une solution efficace, mais le maintien d'une hygiène correcte entre les dents fixées demande plus d'attention et d'effort.



Comment cela se passe-t-il ?

Rendez-vous de 30 minutes : Les dents inférieures sont scannées et le scan est envoyé au laboratoire K-Dent.

Rendez-vous de 60 minutes une semaine après : le fil de contention inférieure est posé. La procédure est simple et sans aucune douleur. Elle ressemble à la procédure de la pose des taquets (attaches). Elle dure 15 minutes.

Ensuite tous les taquets sont déposés. Un scan des dents supérieures est réalisé et envoyé à Invisalign pour commander une gouttière de contention Vivera en 3 exemplaires.

Les gouttières Vivera sont numérotées, mais elles ne doivent pas être portées successivement. Vous changez à la nouvelle uniquement en cas de l'épuisement de la précédente. La durée de vie d'une gouttière est de 6 à 12 mois. Les conseils d'entretien des gouttières de correction (Invisalign) sont aussi valables pour les gouttières de contention Vivera.

Le dossier photographique de documentation finale est fait.

Les gouttières de contention Vivera sont livrées dans 1 semaine à 10 jours. Vous pouvez venir les chercher sans rendez-vous. Les instructions vous seront données lors de la dernière consultation.

Rappel des informations importantes faisant partie du plan de traitement et du devis accepté :

* Contentions à la fin du traitement orthodontique :

Une fois, le traitement orthodontique est terminé, vos dents et mâchoires ne sont pas statiques, mais continuent à changer (migration dentaire physiologique et croissance osseuse continue...). Certaines corrections ont tendance à récidiver plus que d'autres (les rotations dentaires, les béances...).

De ces faits, une contention fixe **à vie** sous forme d'un fil métallique collé derrière les dents inférieures est absolument indispensable. L'entretien de ces fils lors du brossage dentaire est très important. Il est de votre responsabilité de passer quotidiennement le fil dentaire (Superfloss) entre les dents et en dessous du fil. Veillez à ne pas trop appuyer sur le fil, car cela peut le plier ou le décoller et faire bouger les dents. Notre hygiéniste dentaire Aurélie Fonjallaz vous coache sur la meilleure façon d'entretenir ces fils de contention. Dans certains cas et en sus d'un fil de contention, une contention amovible supérieure sous forme d'une gouttière sera aussi nécessaire. Elle doit être portée sur les dents de la manière suivante : 1er 3mois pour 18h par jour, puis les 3mois suivants 12 à 14h et ensuite juste la nuit durant au moins 1 année. Les heures de sommeil sont comptées dans les heures de port. Lorsque vous ne portez pas votre gouttière, conservez-la dans la boîte fournie.

Contention perdue ou cassée

Merci d'appeler le cabinet immédiatement si vos dispositifs de contention se cassent, se décollent ou se perdent.

Vos dispositifs de contention sont fabriqués avec le meilleur matériau possible. Ils sont garantis **12 mois** et sont réparés gratuitement pendant cette période. Au-delà de cette période, des frais de laboratoire seront facturés pour chaque remplacement.

